



PIANO TERAPEUTICO AIFA PER PRESCRIZIONE SSN DI INTERFERONI

CENTRO PRESCRITTORE

CODICE FISCALE

NOME COGNOME

DATA NASCITA

SESSO

TEL

RESIDENZA

ASL DI RESIDENZA

TESSERA SANITARIA

MMG

ALTRE PATOLOGIE: CARCINOMA RENALE AVANZATO PRINCIPIO ATTIVO: INTERFERONE ALFA-2A RICOMBINANTE; INTERFERONE ALFA NATURALE LEUCOCITARIO - DA IMPIEGARE IN CASO DI INTOLLERANZA AGLI INTERFERONI RICOMBINANTI (IN PRESENZA DI DOCUMENTATA INTOLLERANZA SOGGETTIVA O NEUTROPENIA O PIASTRINOPENIA CON CONTA DEI NEUTROFILI persistentemente inferiori a 750/MMC E/O PIASTRINE persistentemente inferiori a 50.000/MMC, CHE COMPAIANO IN CORSO DI TERAPIA CON ALTRI INTERFERONI, E CHE NE IMPEDISCANO LA PROSECUZIONE IN P

ALTRE PATOLOGIE: LEUCEMIA A CELLULE CAPELLUTE PRINCIPI ATTIVI: INTERFERONE ALFA-2A RICOMBINANTE; INTERFERONE ALFA-2B RICOMBINANTE; INTERFERONE ALFA NATURALE LEUCOCITARIO - DA IMPIEGARE IN CASO DI INTOLLERANZA AGLI INTERFERONI RICOMBINANTI (IN PRESENZA DI DOCUMENTATA INTOLLERANZA SOGGETTIVA O NEUTROPENIA O PIASTRINOPENIA CON CONTA DEI NEUTROFILI persistentemente inferiori a 750/MMC E/O PIASTRINE persistentemente inferiori a 50.000/MMC, CHE COMPAIANO IN CORSO DI TERAPIA CON ALTRI INTERFERONI, E CH

ALTRE PATOLOGIE: LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA PRINCIPI ATTIVI: INTERFERONE ALFA-2A RICOMBINANTE; INTERFERONE ALFA-2B RICOMBINANTE; INTERFERONE ALFA NATURALE ALFA LEUCOCITARIO - DA IMPIEGARE IN CASO DI INTOLLERANZA AGLI INTERFERONI RICOMBINANTI (IN PRESENZA DI DOCUMENTATA INTOLLERANZA SOGGETTIVA O NEUTROPENIA O PIASTRINOPENIA CON CONTA DEI NEUTROFILI persistentemente inferiori a 750/MMC E/O PIASTRINE persistentemente inferiori a 50.000/MMC, CHE COMPAIANO IN CORSO DI TERAPIA CON ALTRI INTERFERONI, E

ALTRE PATOLOGIE: LINFOMA CUTANEO A CELLULE T PRINCIPIO ATTIVO: INTERFERONE ALFA-2A RICOMBINANTE

ALTRE PATOLOGIE: LINFOMA NON HODGKIN FOLLICOLARE. PRINCIPI ATTIVI: INTERFERONE ALFA-2A RICOMBINANTE; INTERFERONE ALFA-2B RICOMBINANTE; INTERFERONE ALFA NATURALE LEUCOCITARIO - DA IMPIEGARE IN CASO DI INTOLLERANZA AGLI INTERFERONI RICOMBINANTI (IN PRESENZA DI DOCUMENTATA INTOLLERANZA SOGGETTIVA O NEUTROPENIA O PIASTRINOPENIA CON CONTA DEI NEUTROFILI persistentemente inferiori a 750/MMC E/O PIASTRINE persistentemente inferiori a 50.000/MMC, CHE COMPAIANO IN CORSO DI TERAPIA CON ALTRI INTERFERONI,

ALTRE PATOLOGIE: MELANOMA MALIGNO. PRINCIPI ATTIVI: INTERFERONE ALFA-2A RICOMBINANTE; INTERFERONE ALFA-2B RICOMBINANTE; INTERFERONE ALFA NATURALE A LEUCOCITARIO - DA IMPIEGARE IN CASO DI INTOLLERANZA AGLI INTERFERONI RICOMBINANTI (IN PRESENZA DI DOCUMENTATA INTOLLERANZA SOGGETTIVA O NEUTROPENIA O PIASTRINOPENIA CON CONTA DEI NEUTROFILI persistentemente inferiori a 750/MMC E/O PIASTRINE persistentemente inferiori a 50.000/MMC, CHE COMPAIANO IN CORSO DI TERAPIA CON ALTRI INTERFERONI, E CHE NE IMPE

ALTRE PATOLOGIE: MICOSI FUNGOIDE PRINCIPIO ATTIVO: INTERFERONE ALFA NATURALE LEUCOCITARIO

ALTRE PATOLOGIE: MIELOMA MULTIPLO PRINCIPIO ATTIVO: INTERFERONE ALFA-2B RICOMBINANTE; INTERFERONE ALFA NATURALE LEUCOCITARIO - DA IMPIEGARE IN CASO DI INTOLLERANZA AGLI INTERFERONI RICOMBINANTI (IN PRESENZA DI DOCUMENTATA INTOLLERANZA SOGGETTIVA O NEUTROPENIA O PIASTRINOPENIA CON CONTA DEI NEUTROFILI persistentemente inferiori a 750/MMC E/O PIASTRINE persistentemente inferiori a 50.000/MMC, CHE COMPAIANO IN CORSO DI TERAPIA CON ALTRI INTERFERONI, E CHE NE IMPEDISCANO LA PROSECUZIONE IN PRESENZA

ALTRE PATOLOGIE: SARCOMA DI KAPOSI CORRELATO ALL'AIDS O AD ALTRE CONDIZIONI CLINICHE DI IMMUNODEPRESSIONE PRINCIPI ATTIVI: INTERFERONE ALFA-2A RICOMBINANTE; INTERFERONE ALFA-2B RICOMBINANTE; INTERFERONE ALFA NATURALE LEUCOCITARIO - DA IMPIEGARE IN CASO DI INTOLLERANZA AGLI INTERFERONI RICOMBINANTI (IN PRESENZA DI DOCUMENTATA INTOLLERANZA SOGGETTIVA O NEUTROPENIA O PIASTRINOPENIA CON CONTA DEI NEUTROFILI persistentemente inferiori a 750/MMC E/O PIASTRINE persistentemente inferiori a 50.000 /MMC, C

ALTRE PATOLOGIE: TUMORE CARCINOIDE PRINCIPIO ATTIVO: INTERFERONE ALFA-2B RICOMBINANTE;

EPATITE C: IN COMBINAZIONE CON RIBAVIRINA O IN MONOTERAPIA, SE ESISTONO CONTROINDICAZIONI ALLA RIBAVIRINA: TRATTAMENTO DELL'EPATITE CRONICA C IN PAZIENTI ADULTI CON IPERTRANSAMINASEMIA E POSITIVITÀ PER HCV-RNA, INCLUSI PAZIENTI CON MALATTIA EPATICA AVANZATA (CIRROSI EPATICA COMPENSATA - CHILD A) E/O CON CO-INFEZIONE DA HIV, MAI TRATTATI IN PRECEDENZA CON INTERFERONI O IN RECIDIVA DOPOPRECEDENTE TRATTAMENTO CON INTERFERONI. PRINCIPI ATTIVI: INTERFERONE ALFA-2A PEGHILATO; INTERFERONE ALFA-2B PEGH

EPATITE C: IN COMBINAZIONE CON RIBAVIRINA O IN MONOTERAPIA, SE ESISTONO CONTROINDICAZIONI ALLA RIBAVIRINA: TRATTAMENTO DELL'EPATITE CRONICA C IN PAZIENTI ADULTI CON IPERTRANSAMINASEMIA E POSITIVITÀ PER HCV-RNA; DA RISERVARE A PAZIENTI CON PROBLEMI DI INTOLLERANZA AGLI INTERFERONI (PRESENZA DI DOCUMENTATA INTOLLERANZA SOGGETTIVA O NEUTROPENIA O PIASTRINOPENIA CON CONTA DEI NEUTROFILI persistentemente inferiori a 750/MMC E/O PIASTRINE persistentemente inferiori a 50.000/MMC, CHE COMPAIANO IN CORSO



PIANO TERAPEUTICO AIFA PER PRESCRIZIONE SSN DI INTERFERONI

CENTRO PRESCRITTORE

CODICE FISCALE

NOME COGNOME

DATA NASCITA

SESSO

TEL

RESIDENZA

ASL DI RESIDENZA

TESSERA SANITARIA

MMG

EPATITE C: IN COMBINAZIONE CON RIBAVIRINA O IN MONOTERAPIA, SE ESISTONO CONTROINDICAZIONI ALLA RIBAVIRINA: TRATTAMENTO DELL'EPATITE CRONICA C IN PAZIENTI CHE HANNO FALLITO UN PRECEDENTE TRATTAMENTO DI COMBINAZIONE CON INTERFERONE ALFA (PEGHILATO O NON PEGHILATO) E RIBAVIRINA O LA MONOTERAPIA CON INTERFERONE ALFA. PRINCIPIO ATTIVO: INTERFERONE ALFA-2A PEGHILATO; INTERFERONE ALFA-2B PEGHILATO.

EPATITE C: IN COMBINAZIONE CON RIBAVIRINA O IN MONOTERAPIA, SE ESISTONO CONTROINDICAZIONI ALLA RIBAVIRINA: TRATTAMENTO DI PAZIENTI CON MALATTIA EPATICA AVANZATA (CIRROSI EPATICA COMPENSATA - CHILD A) E/O CON CO-INFEZIONE DA HIV CHE HANNO FALLITO UN PRECEDENTE TRATTAMENTO DI COMBINAZIONE CON INTERFERONE ALFA (PEGHILATO O NON PEGHILATO) E RIBAVIRINA O LA MONOTERAPIA CON INTERFERONE ALFA. IL TRATTAMENTO DEVE ESSERE LIMITATO A 12 SETTIMANE IN CASO DI MANCATA RISPOSTA VIROLOGICA COMPLETA. PRINCIPI ATT

EPATITE CRONICA B HBV-DNA-POSITIVA, CON IPERTRANSAMINEMIA PRINCIPI ATTIVI: INTERFERONE ALFA-2A RICOMBINANTE; INTERFERONE ALFA-2B RICOMBINANTE; INTERFERONE ALFA-2A PEGHILATO; INTERFERONE ALFA NATURALE LEUCOCITARIO - - NOTA: INTERFERONE ALFA NATURALE LEUCOCITARIO SOLO IN CASO DI INTOLLERANZA AGLI INTERFERONI RICOMBINANTI (PRESENZA DI DOCUMENTATA INTOLLERANZA SOGGETTIVA O NEUTROPENIA O PIASTRINOPENIA CON NEUTROFILI PERSISTENTEMENTE < A 750/MMC E/O PIASTRINE PERSISTENTEMENTE < A 50.000/MMC, CHE COMP

EPATITE CRONICA B HBV-DNA-POSITIVA, CON MALATTIA AVANZATA (CON STADIO DI FIBROSI \geq F 2 O DIAGNOSI CLINICA DI CIRROSI) IN CUI L'INTERFERONE SIA CONTROINDICATO, O NON TOLLERATO O INEFFICACE, COME TERAPIA SOPPRESSIVA SENZA LIMITI TEMPORALI NÉ DI ASSOCIAZIONE

EPATITE CRONICA B-DELTA (MONOTERAPIA) PRINCIPI ATTIVI: INTERFERONE ALFA-2A RICOMBINANTE; INTERFERONE ALFA-2B RICOMBINANTE; INTERFERONE ALFA NATURALE LEUCOCITARIO - NOTA: INTERFERONE ALFA NATURALE LEUCOCITARIO SOLO IN CASO DI INTOLLERANZA AGLI INTERFERONI RICOMBINANTI (PRESENZA DI DOCUMENTATA INTOLLERANZA SOGGETTIVA O NEUTROPENIA O PIASTRINOPENIA CON NEUTROFILI PERSISTENTEMENTE < A 750/MMC E/O PIASTRINE PERSISTENTEMENTE < A 50.000/MMC, CHE COMPAINO IN CORSO DI TERAPIA CON ALTRI INTERFERONI)

CONFEZIONAMENTO E FORMA FARMACEUTICA

DOSE/DIE UNA AL GIORNO

DURATA PREVISTA TRATTAMENTO 12 MESI

☒ PRIMA PRESCRIZIONE☐ PROSECUZIONE DELLA CURA

DATA REDAZIONE 10/02/2017