



PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DEI FARMACI
NOTA 85 PER IL TRATTAMENTO DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura di Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD) individuate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano

Centro Prescrittore	<input type="text"/>		
Medico Prescrittore	<input type="text"/>		
Tel.	<input type="text"/>	e-mail	<input type="text"/>

Codice fiscale	<input type="text"/>	Cognome nome	<input type="text"/>
Data nascita	<input type="text"/>	Sesso	<input checked="" type="radio"/> Maschio <input type="radio"/> Femmina
Asl Residenza	<input type="text"/>	Residenza	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	MMG	<input type="text"/>

Indicazioni autorizzate e rimborsate SSN:
Trattamento della malattia di Alzheimer
- di grado lieve, con MMSE tra 21 e 26 (donepezil, rivastigmina, galantamina)
- di grado moderato, con MMSE tra 10 e 20 (donepezil, rivastigmina, galantamina, memantina)
- di grado severo, con MMSE <10 (memantina)

La prescrizione deve essere effettuata in accordo con i singoli Riassunti delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

Diagnosi
<input checked="" type="checkbox"/> Diagnosi di demenza di Alzheimer probabile secondo i criteri NIA-AA, 2011 (Mc Khann 2011)
MMSE corretto: <input type="text"/> /30
<input type="radio"/> Alzheimer lieve (MMSE tra 21 e 26)
<input checked="" type="radio"/> Alzheimer moderato (MMSE tra 10 e 20)
<input type="radio"/> Alzheimer grave (MMSE < 10)

La risposta clinica dovrà essere monitorata presso i CDCD ad intervalli regolari dall’inizio della terapia:
- a 1 mese, per la valutazione degli effetti collaterali e per l’aggiustamento del piano terapeutico
- a 3 mesi, per una prima valutazione della risposta e per il monitoraggio della tollerabilità: la rimborsabilità del trattamento oltre i 3 mesi deve basarsi sul non peggioramento, sulla base del giudizio di efficacia nel contesto di una valutazione clinica complessiva
- ogni 6 mesi ** per successive valutazioni della risposta e della tollerabilità.

** nei casi di stabilità clinica, il rinnovo del Piano Terapeutico potrà avvenire entro un massimo 12 mesi.

Programma terapeutico:

Se il paziente progredisce a una forma severa (punteggio MMSE < 10) occorre valutare attentamente l’opportunità di proseguire il trattamento, sulla base della valutazione del profilo benefico/ rischio su base individuale.

PROGRAMMA TERAPEUTICO

Farmaco

Posologia

Durata trattamento

☐ Giorni

☒ Mesi

1

Data Termine

☒ Prima prescrizione

☐ Prosecuzione cura

☐ con modifiche

☐ senza modifiche

Data Emissione

Si consiglia monitoraggio periodico con ECG per valutazione del QTc in particolare per i pazienti con: disturbi del ritmo cardiaco, malattia cardiaca clinicamente rilevante e/o in politerapia con farmaci che possono influenzare il QTc o che inducono bradicardia o in presenza di squilibri elettrolitici.

La validità del Piano terapeutico è al massimo di 12 mesi

Stampato il 06/09/2023