

PIANO TEREPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DEGLI AGONISTI DEL GLP-1R NEL  
DIABETE DI TIPO 2

Da redigere ai fini della rimborsabilità a cura delle strutture diabetologiche individuate dalle Regioni, ed inviare al Servizio Farmaceutico della ASL e al Medico di Medicina Generale che ha in carico l'assistito. La validità temporale del Piano Terapeutico è di dodici mesi; durante tale periodo la continuità di prescrizione può quindi essere affidata al Medico di Medicina Generale. Qualora il valore di Hb<sub>A1c</sub> dopo sei mesi di terapia non rientrasse nei limiti inizialmente indicati dallo specialista redattore del Piano Terapeutico, oppure siano sopraggiunte controindicazioni o intolleranza alla terapia prescritta, la rivalutazione della stessa da parte dello specialista dovrà essere anticipata rispetto al limite dei dodici mesi.

Centro Prescrittore			
Medico Prescrittore			
Tel.		e-mail	

Codice fiscale				Cognome nome			
Data nascita				Sesso	<input checked="" type="radio"/> Maschio <input type="radio"/> Femmina		
Asl Residenza				Residenza			
Tel.				MMG			
Pregresso evento cardiovascolare						<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
Alto* rischio cardiovascolare						<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
Peso(Kg)		H(cm)		BMI		Circonferenza vita (cm)	
Ultimo valore HbA1c(% oppure mmol/mol):							
Target o intervallo appropriato di HbA1c a giudizio dello specialista (% oppure mmol/mol)							
Ipoglicemie severe o comunque condizionanti le attività quotidiane negli ultimi tre mesi?						<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
Reazioni avverse (soltanto al follow-up)							
<input type="radio"/> Si (compilare la scheda di segnalazione ADR Ministeriale come da Normativa vigente)						<input type="radio"/> NO	

\* Si definiscono soggetti ad alto rischio cardiovascolare coloro che presentano una probabilità, calcolata mediante le carte italiane del rischio cardiovascolare, ≥ 20% di presentare un evento CV fatale o non fatale nei successivi 10 anni (<http://www.cuore.iss.it/valutazione/carte.asp>). Vedi carte del rischio allegate.

Dose e durata del trattamento			
<input checked="" type="checkbox"/> Prima prescrizione <input type="checkbox"/> Prosecuzione cura			
	Posologia	Regime Terapeutico	
Liraglutide	<div><div></div><div>Penne pre-riempite 6 mg/ml (posologia variabile da 0.6 a 1.8 mg/die a seconda della risposta clinica)</div></div>	<div>In associazione con:</div> <div><div><input type="checkbox"/> Metformina<input type="checkbox"/> Sulfonilurea<input type="checkbox"/> Insulina basale<input type="checkbox"/> Pioglitazione</div><div><input type="checkbox"/> Metformina e sulfonilurea<input type="checkbox"/> Metformina e pioglitazione<input type="checkbox"/> Metformina e insulina basale</div></div>	
Data Decorrenza	09/08/2019	Data Termine	09/09/2019

Sezione riservata al MMG

MMG

Ultimo valore HbA1c:

Unità di misura

☐ MMOL/MOL


☐ %

☐

Proroga del Piano Terapeutico per un massimo di 6 mesi a seguito di follow-up, verificate le condizioni cliniche

CARTE ITALIANE PER LA STIMA DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE NELLA POPOLAZIONE AFFETTA DA DIABETE MELLITO (<http://www.cuore.iss.it/valutazione/carte.asp>)

DONNE



LIVELLI DI RISCHIO CV

livello di rischio a 10 anni		
rischio MCV VI	oltre 30%	
rischio MCV V	20% - 30%	
rischio MCV IV	15% - 20%	
rischio MCV III	10% - 15%	
rischio MCV II	5% - 10%	
rischio MCV I	meno 5%	

UOMINI

