



S.I.S. :REGIONE PUGLIA  
ASL: 160114 - BA

PRESCRIZIONE A CARICO DEL SSN DI IPOLIPEMIZZANTI IN  
CONFORMITA' ALLA NOTA AIFA 13

Centro Prescrittore	ISTITUTO AMEDEO D'AOSTA		
Medico Prescrittore			
Telefono		e-mail	

Paziente Codice fiscale	NTNFNC67T02A662X	Cognome nome	ANTONACCI FRANCESCO
Data nascita	02/12/1967	Sesso	<input checked="" type="radio"/> Maschio <input type="radio"/> Femmina
Asl Residenza	160114	Residenza	STRADA VICINALE DONNA LISA

ROSUVASTATINA	
Trattamento di 1° livello	Trattamento di 2° livello
Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta, seguita per almeno tre mesi / ipercolesterolemia poligenica secondo i criteri specificati dalle Linee Guida ESC/EAS	
<input checked="" type="radio"/> Pazienti con rischio molto alto (score >= 10% con evidenza di effetti collaterali severi nei primi 6 mesi di terapia con altre statine	<input type="radio"/> Pazienti con rischio alto (score > 5% < 10%)
Dislipidemie familiari	
<input type="radio"/> Ipercolesterolemia Familiare Monogenica (FH)	<input checked="" type="radio"/> Iperlipidemia Familiare Combinata <input type="radio"/> Disbetalipoproteinemia
EZETIMIBE in monoterapia	
Trattamento di 1° livello	Trattamento di 2° livello
Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta, seguita per almeno tre mesi e ipercolesterolemia poligenica secondo i criteri specificati dalle Linee Guida ESC/EAS	
Limitatamente ai pazienti che siano intolleranti alle statine, per il conseguimento del target terapeutico è rimborsato il trattamento con ezetimibe in monoterapia	
<input type="radio"/> Pazienti con rischio moderato score 4-5% <input type="radio"/> Pazienti con rischio alto score >5% < 10% <input type="radio"/> Pazienti con rischio molto alto score >=10%	<input type="radio"/> Pazienti con rischio medio score 2-3%
Iperlipidemie indotte da farmaci non corrette dalla sola dieta secondo i criteri esplicativi	
<input type="checkbox"/> Farmaci Immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori della aromatasi  In monoterapia per i pazienti che non tollerano il trattamento con statine o non possono eseguirlo	

EZETIMIBE in associazione (precostituita o estemporanea) a STATINE	
Trattamento di 1° livello	Trattamento di 2° livello
Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta, seguita per almeno tre mesi / ipercolesterolemia poligenica secondo i criteri specificati dalle Linee Guida ESC/EAS	
	<div><input type="radio"/> Pazienti con rischio alto (score &gt; 5% &lt; 10%)</div> <div><input type="radio"/> Pazienti con rischio molto alto (score &gt;= 10%)</div>
Dislipidemie familiari	
	<div><input type="radio"/> Ipercolesterolemia familiare monogenica (FH)</div> <div><input type="radio"/> Iperlipidemia familiare combinata</div> <div><input type="radio"/> Disbetalipoproteinemia</div>
Iperlipidemie in pazienti con insufficienza renale cronica moderata e grave	
<input type="checkbox"/> Paziente con livelli di LDL-C >= 130mg/dL	

Farmaco Prescritto	
Rosuvastatina in monoterapia	
<div><input checked="" type="radio"/> Rosuvastatina 5 mg</div> <div><input type="radio"/> Rosuvastatina 10 mg</div> <div><input type="radio"/> Rosuvastatina 20 mg</div>	
Ezetimibe in associazione precostituita	
<div><input type="radio"/> Ezetimibe+Simvastatina 10 mg/10 mg</div> <div><input type="radio"/> Ezetimibe+Simvastatina 10 mg/20 mg</div> <div><input type="radio"/> Ezetimibe+Simvastatina 10 mg/40 mg</div>	
Ezetimibe in monoterapia	
<input type="checkbox"/> Ezetimibe 10 mg	
Ezetimibe in associazione estemporanea	
<input type="checkbox"/> Ezetimibe 10 mg	<div></div>
Posologia	<div>una al giorno</div>
Data Redazione	<div>28/03/2017</div>