



PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DI INSULINA
GLARGINE/LIXISENATIDE IN ASSOCIAZIONE FISSA PER IL
TRATTAMENTO DEL DIABETE DI TIPO II

Da compilare ai fini della rimborsabilità SSN a cura dei centri ospedalieri individuati dalle Regioni o medici specialisti (endocrinologo, internista, geriatra) operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale.

Rinnovare ogni 12 mesi da la data di compilazione.

Centro Prescrittore			
Medico Prescrittore			
Tel.		e-mail	

Codice fiscale		Cognome nome		
Data nascita		Sesso	<input checked="" type="radio"/> Maschio <input type="radio"/> Femmina	
Asl Residenza		Residenza		
Tel.		MMG		
Nr. Tessera Sanitaria		Peso(Kg)	H(cm)	

Indicazione rimborsata SSN

La rimborsabilità a carico del SSN è limitata ai pazienti in adeguatamente controllati dalla precedente linea di terapia con insulina basale e altri ipoglicemizzanti orali. L'associazione fissa insulina glargine/lixisenatide non è stata studiata in pazienti naïve al trattamento, in associazione a regimi insulinici multi-iniettivi e in associazione ad inibitori SGLT-2; in tali casi non è pertanto riconosciuta la rimborsabilità.

Si sottolinea che l'associazione fissa insulina glargine/lixisenatide non permette nella maggior parte dei casi di sostituire automaticamente i due principi attivi già assunti separatamente; in tali casi sarà pertanto necessaria una opportuna modifica dei dosaggi, secondo giudizio clinico.

PROGRAMMA TERAPEUTICO				
Farmaco				
Posologia				
Durata trattamento (non oltre 12 mesi)	<input type="checkbox"/> Giorni		<input checked="" type="checkbox"/> Mesi	1
			Data Termine	22/11/2018
<input checked="" type="checkbox"/> Prima prescrizione	<input type="checkbox"/> Prosecuzione cura			
Data Emissione	22/10/2018			

Per evitare errori terapeutici, accertarsi di indicare sulla prescrizione la corretta concentrazione di Suliqua e il numero di dosi unitarie (cfr. par 4.2).

Compromissione renale: Non è raccomandato in pazienti con grave compromissione renale e malattia renale terminale, dal momento che l'esperienza terapeutica dell'uso di lixisenatide è insufficiente. Nei pazienti con compromissione renale da lieve a moderata possono essere necessari frequenti monitoraggi della glicemia e correzioni della dose.