



PRESCRIZIONE A CARICO DEL SSN DI IPOLIPEMIZZANTI IN
CONFORMITA' ALLA NOTA AIFA 13

Centro Prescrittore	<input type="text"/>		
Medico Prescrittore	<input type="text"/>		
Telefono	<input type="text"/>	e-mail	<input type="text"/>

Paziente Codice fiscale	<input type="text"/>	Cognome nome	<input type="text"/>
Data nascita	<input type="text"/>	Sesso	<input checked="" type="radio"/> Maschio <input type="radio"/> Femmina
Asl Residenza	<input type="text"/>	Residenza	<input type="text"/>

EZETIMIBE in monoterapia	
Trattamento di 1° livello	Trattamento di 2° livello
Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta, seguita per almeno tre mesi e ipercolesterolemia poligenica secondo i criteri specificati dalle Linee Guida ESC/EAS	
Limitatamente ai pazienti che siano intolleranti alle statine, per il conseguimento del target terapeutico è rimborsato il trattamento con ezetimibe in monoterapia	
<input checked="" type="checkbox"/> Intollerante a statine <input checked="" type="radio"/> Pazienti con rischio moderato score 4-5% <input type="radio"/> Pazienti con rischio alto score >5% < 10% <input type="radio"/> Pazienti con rischio molto alto score >=10%	<input type="checkbox"/> Intollerante a statine <input type="radio"/> Pazienti con rischio medio score 2-3%
Iperlipidemie indotte da farmaci non corrette dalla sola dieta secondo i criteri esplicativi	
<input type="checkbox"/> Intollerante a statine <input type="checkbox"/> Farmaci Immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori della aromatasi In monoterapia per i pazienti che non tollerano il trattamento con statine o non possono eseguirlo	

EZETIMIBE in associazione (precostituita o estemporanea) a STATINE	
Trattamento di 1° livello	Trattamento di 2° livello
Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta, seguita per almeno tre mesi / ipercolesterolemia poligenica secondo i criteri specificati dalle Linee Guida ESC/EAS	
	<input type="radio"/> Pazienti con rischio alto (score > 5% < 10%) <input type="radio"/> Pazienti con rischio molto alto (score >= 10%)
Dislipidemie familiari	
	<input type="radio"/> Ipercolesterolemia familiare monogenica (FH) <input type="radio"/> Iperlipidemia familiare combinata <input type="radio"/> Disbetalipoproteinemia

Iperlipidemie in pazienti con insufficienza renale cronica moderata e grave	
<input type="checkbox"/> Paziente con livelli di LDL-C >= 130mg/dL	

Farmaco Prescritto	
Ezetimibe in associazione precostituita	
<input type="radio"/> Ezetimibe+Simvastatina 10 mg/10 mg <input type="radio"/> Ezetimibe+Simvastatina 10 mg/20 mg <input type="radio"/> Ezetimibe+Simvastatina 10 mg/40 mg	
<input type="radio"/> Rosuvastatina+Ezetimibe 10mg/10mg <input type="radio"/> Rosuvastatina+Ezetimibe 20mg/10mg	
Ezetimibe in monoterapia	
<input checked="" type="checkbox"/> Ezetimibe 10 mg	
Ezetimibe in associazione estemporanea	
STATINE	
<input type="checkbox"/> Ezetimibe 10 mg	
Posologia	
Data Redazione	26/07/2018