



S.I.S. :REGIONE PUGLIA

ASL: 160113 - BT

Scheda cartacea per la prescrizione della specialità medicinale XYBALDA

Indicazioni terapeutiche: Trattamento delle infezioni batteriche acute della pelle e della struttura cutanea (ABSSSI) negli adulti. Occorre prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Per ABSSSI sono da intendersi le infezioni complicate della cute e dei tessuti sottocutanei. La rimborsabilità è limitata alle sole infezioni complicate della cute e dei tessuti molli quando si sospetta o si ha la certezza che l'infezione sia causata da batteri Gram positivi sensibili.

Centro Prescrittore	<input type="text"/>		
Medico Prescrittore (*)	<input type="text"/>		
Telefono (*)	<input type="text"/>	e-mail	<input type="text"/>

* La prescrivibilità è riservata allo specialista infettivologo, o in sua assenza, ad altro specialista con competenza infettivologica ad hoc identificato dal Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) istituito per legge presso tutti i presidi ospedalieri (Circolare Ministero della Sanità n. 52/1985).

Codice fiscale	<input type="text"/>	Cognome nome	<input type="text"/>
Data nascita	<input type="text"/>	Sesso	<input checked="" type="radio"/> Maschio <input type="radio"/> Femmina
Asl Residenza	<input type="text"/>	Residenza	<input type="text"/>

Diagnosi:	Infezioni batteriche acute della pelle e della struttura cutanea (ABSSSI) negli adulti sostenuta con batteri Gram positivi sensibili		
	<input checked="" type="radio"/> Sospetta <input type="radio"/> Certa		
Specificare se:			
	<input type="radio"/> Inizio Terapia		
	<input type="radio"/> Prosecuzione cura		
	<input type="radio"/> 2-3 linea di trattamento - trattamento precedente	<input type="text"/>	

PROGRAMMA TERAPEUTICO			
Farmaco	<input type="text"/>		
Dosaggio	<input type="checkbox"/> Giorno1: 1500 mg	<i>oppure</i>	<input type="checkbox"/> Giorno1: 1000 mg - Giorno 8: 500 mg
<i>Dose raccomandata e durata del trattamento per gli adulti: la dose raccomandata per la dalbavancina è di 1.500 mg somministrati come singola infusione da 1.500 mg oppure 1.000 mg seguiti, una settimana dopo, da 500 mg (vedere paragrafi 5.1 e 5.2). Esistono dati limitati sulla sicurezza e l'efficacia della dalbavancina somministrata per più di due dosi (a distanza di una settimana)</i>			
Data Emissione	<input type="text" value="14/12/2017"/>	Data Termine	<input type="text"/>