



REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
P.za G. Cesare, 11 – 70124 BARI

DIREZIONE SANITARIA
Tel 080-5591111 Fax 080-5575736
e-mail direzione.sanitaria@policlinico.ba.it

CIRCOLARE N 37 /2020/DS

0023193|16/03/2020
|AOUCPG23|UDG|P

16 MAR. 2020

/DS

70124 Bari
Partita IVA e Codice fiscale 04846410720

Ai Sigg. Direttori U.U. OO.
Ai Sigg. CPSS/Referenti
Policlinico - Bari
Ai Sig. Dirigente Responsabile
U.O.S. I.C.T. Aziendale
e, p.c. Ai Sigg. Dirigenti Medici
Direzione Medica di Presidio
Policlinico
LORO SEDI

Oggetto: Gestione della richiesta di DPI Emergenza COVID-19.

Per garantire la tempestiva e corretta dispensazione di DPI è stato istituito presso il Magazzino Economale un Centro di distribuzione H24.

Al fine di regolamentare la corretta richiesta e ritiro, si comunica di seguito la procedura da seguire in ogni caso:

1. la richiesta di DPI deve sempre essere effettuata mediante software SILOR (già attivo);
2. ogni richiesta deve essere preventivamente autorizzata dalla scrivente Direzione Sanitaria;
3. successivamente si potrà procedere al ritiro dalla sede di distribuzione centralizzata presso il Magazzino Economale;
4. in ogni Unità Operativa deve essere nominato un Referente per la gestione interna che vigili sul corretto utilizzo dei DPI, il cui nominativo deve essere trasmesso all'indirizzo mail savino.soldano@policlinico.ba.it;
5. Il Referente individuato dovrà trasmettere quotidianamente, sempre all'indirizzo di cui al punto 4, un report sulle giacenze di DPI.

Si coglie l'occasione per ricordare, ancora una volta l'importanza del corretto utilizzo degli stessi, secondo la Tabella realizzata dall'SPP e dal Medico Competente di questa Azienda e già trasmessa con Circolare N.34/2020, che ad ogni buon fine si allega in copia., dalla quale si evince che l'utilizzo delle tute integrali e delle mascherine FFP3 è consentito esclusivamente nelle aree in cui si effettuano procedure su pazienti positivi per COVID-19 che generano aerosol (intubazione, ventilazione assistita).


Si invita il Sig. Dirigente Responsabile a disporre per la pubblicazione della presente Circolare sul Sito Intranet Aziendale.

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE SANITARIO
dott.ssa Matilde CARLUCCI

Dispositivi individuali (DPI) prescritti per l'uso nell'ambito della malattia da coronavirus
Adattato da WHO's novel coronavirus (COVID -19) <https://www.who.int>

AREA	DESTINATARIO	ATTIVITA'	PRESIDI/DPI o PROCEDURA
Locali adibiti al ricovero			
Stanze di degenza	Operatori sanitari	Cura dei pazienti sospetti o con COVID -19	Maschera filtrante FFP2 o Mascherina chirurgica Camice protettivo TNT monouso Guanti Protezione oculare (occhiali o schermo facciale)
	Operatori sanitari	Procedure che possono generare aerosol eseguite su pazienti sospetti o con COVID -19 (es. Tampone – esplorazione faringe)	Maschera filtrante FFP3 Camice protettivo rinforzato DPI III categoria Guanti (vinile/ nitrile) Protezione oculare (occhiali o schermo facciale)
	Addetti alle pulizie	Ingresso nella stanza di pazienti sospetti o con COVID -19	Mascherina filtrante FFP2 o Mascherina Chirurgica Camice protettivo TNT monouso Guanti (vinile o nitrile) Protezione oculare (se rischio di schizzi di materiale organico o chimico)
	Paziente e genitore (deve rimanere nella stanza)		Maschera chirurgica all'ingresso del personale
Altre aree di transito del paziente (corridoi, luoghi di passaggio)	Tutti	Qualsiasi attività che non prevede contatto con pazienti affetti da COVID – 19	Non sono richiesti DPI



AREA	DESTINATARIO	ATTIVITA'	PRESIDI/DPI o PROCEDURA
Pronto soccorso			
Pre-triage	Operatori	Filtro pazienti	Mascherina Filtrante FFP2 o Mascherina Chirurgica Camice TNT monouso guanti occhiali/visiera
	Pazienti con sintomatologia respiratoria	Qualsiasi	Far indossare mascherina chirurgica a paziente e accompagnatore
Triage pazienti con sintomatologia respiratoria	Operatori	Screening preliminare senza contatto diretto	Mantenere una distanza di 1 metro
		Contatto diretto	Mascherina chirurgica Guanti
Triage pazienti senza sintomatologia respiratoria	Operatori	Qualsiasi	Non sono richiesti DPI
PS	Operatori sanitari	procedure che possono generare aerosol (es. Tampone esplorazione faringea	Maschera filtrante FFP3 Camice protettivo rinforzato DPI III categoria Guanti Protezione oculare (occhiali o schermo facciale)
PS	Operatori sanitari	Nel caso di paziente sospetto per ulteriori necessità e senza procedure che possono generare aerosol	Mascherina filtrante FFP2 o Mascherina Chirurgica Camice TNT monouso Guanti Protezione oculare (occhiali o schermo facciale)



AREA	DESTINATARIO	ATTIVITA'	PRESIDI/DPI o PROCEDURA
Aree Trasversali			
Laboratorio	Tecnici laboratorio	Manipolazione di campioni di materiale delle vie respiratorie	Da trattare sotto cappa Mascherina Chirurgica Camice protettivo rinforzato DPI III categoria Guanti Schermo protettivo facciale (visiera)
Radiologia	Tecnico radiologia e altri operatori sanitari	pazienti sospetti o con COVID -19	Mascherina Filtrante FFP2 o Mascherina Chirurgica Camice protettivo TNT Guanti Protezione oculare (occhiali o schermo facciale)
Comparto Operatorio	Operatori	Pazienti con COVID – 19	Mascherina Filtrante FFP2 o Mascherina Chirurgica Camice protettivo TNT Guanti Protezione oculare (occhiali o schermo facciale)
Comparto Operatorio	Anestesista Rianimatore	Pazienti con COVID – 19 (attività che generano aerosol)	Maschera filtrante FFP3 Camice protettivo rinforzato DPI III categoria Guanti Protezione oculare (occhiali o schermo facciale)
Locali non adibiti a ricovero			
Ambulatorio	Operatori sanitari	Visita paziente con sintomatologia respiratoria (non differibile)	Mascherina chirurgica
	Paziente con sintomatologia respiratoria	Qualsiasi	Mascherina chirurgica
Sala di attesa	Pazienti con sintomatologia respiratoria	Qualsiasi	Mascherina chirurgica Separare o assicurare distanza di almeno un metro
Aree amministrative	Tutti anche sanitari	Attività non assistenziali	Non sono richiesti DPI assicurare distanza di almeno un metro

Raccomandazioni

Limitare il più possibile il numero di operatori sanitari che entrano nella stanza di pazienti COVID-19. Il tampone deve essere eseguito da un solo operatore sanitario. E' necessario organizzare le attività di cura per ridurre al minimo le entrate nella stanza pianificando in anticipo quali attività saranno eseguite al letto per evitare di continuare a entrare e uscire dalla stanza del paziente. Assicurarsi che l'uso dei DPI sia razionalizzato e appropriato è indispensabile, in quanto L'uso eccessivo ha un impatto sulla difficoltà attuale di approvvigionamento.



