



ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II"
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
Viale Orazio Flacco, 65 – 70126 (Bari)

SCHEDA DI PREPARAZIONE RETTOSIGMOIDOSCOPIA

1. La sera prima dell'esame, a tarda ora, eseguire a 10 minuti di distanza l'uno dall'altro, 2 clisterini già pronti (da 133 ml ciascuno) disponibili in farmacia.
2. La mattina dell'esame, circa un'ora prima dell'appuntamento, eseguire un altro clisterino già pronto.

N.B.:

- Si prega di portare il referto di eventuali esami endoscopici precedenti;
- Si prega di portare i risultati dei seguenti esami eseguiti alcuni giorni prima: PT, PTT, Emocromo con piastrine.
- In caso di assunzione di farmaci antiaggreganti o anticoagulanti, si consiglia di consultare il medico di medicina generale per la sospensione negli 8 giorni precedenti l'esame e l'eventuale sostituzione con eparina a basso peso molecolare secondo le indicazioni del cardiologo o del centro di coagulazione di riferimento. Si raccomanda l'esecuzione dei test di coagulazione dopo la sospensione dei farmaci antiaggreganti o anticoagulanti.

Portare l'eventuale documentazione relativa al motivo per cui si effettua l'esame (per esempio, precedenti esami endoscopici, cartelle cliniche, indicazioni specialistiche).

È necessario:

1. Portare l'eventuale documentazione relativa al motivo per cui si effettua l'esame (per esempio precedenti esami endoscopici, cartelle cliniche, indicazioni specialistiche)
2. Astenersi dalla guida di veicoli dopo l'esame eseguito in sedazione.
3. Registrare/pagare le prestazioni dopo l'esecuzione dell'esame.
4. Avvisare con anticipo in caso di rinuncia all'esecuzione dell'esame chiamando al numero 080/5555540.