



INFORMATIVA ESAMI TC CON MEZZO DI CONTRASTO IODATO

Si informa che per l'esecuzione di esami di TAC con somministrazione endovenosa di agente di contrasto iodato, al fine della valutazione dell'idoneità all'indagine, è necessaria la preventiva esecuzione dei seguenti esami di laboratorio:

Es.urine, azotemia, creatininemia, velocità di filtrazione glomerulare, emocromo con piastrine, transaminasi, glicemia, elettroforesi proteica.

ECG.

E' necessaria, inoltre, la consultazione preventiva con i medici radiologi dell'Unità Operativa di Radiologia Diagnostica in caso di:

- . ipersensibilità o allergia a farmaci, alimenti o altre sostanze
- . insufficienza renale
- . insufficienza epatica grave
- . patologie cardio-vascolari
- . trattamento in atto con farmaci (beta-bloccanti, biguanidi, interleukina)
- . abuso di alcool, droghe.

Il paziente deve:

- . presentarsi il giorno dell'esame, all'orario fissato, a digiuno da almeno 6 ore
- . portare con se' la richiesta del medico curante e dello specialista (se in possesso), la tessera sanitaria e un documento di identità
- . fornire in visione gli esami TC precedentemente effettuati (pellicole e referto radiologico) ed altra eventuale documentazione clinico-radiologica (cartella clinica, esame istologico, esami RM, ecografie, Rx convenzionali).

L'U.O di Radiologia diagnostica assicura la competenza e l'esperienza del Personale Medico Tecnico ed Infermieristico preposto alla somministrazione dei mezzi di contrasto, l'utilizzazione di prodotti iodati meno tossici in commercio, nonché la corretta modalità di preparazione preliminare dei Pazienti che debbano sottoporsi ai suddetti esami radiologici.

Ciò nonostante è possibile, in casi rari, che si possano verificare reazioni al mezzo di contrasto di varia gravità e durata, impreviste ed imprevedibili, e che tali effetti possano essere solo in parte controllabili dagli Specialisti e dai mezzi terapeutici a disposizione.

Tali reazioni possono essere, in casi eccezionali, anche fatali.

Altra evenienza imprevista ed imprevedibile è lo stravasamento del mezzo contrasto nella sede di iniezione.

Effetti indesiderati	Reazioni anafilattoidi LIEVI	Reazioni anafilattoidi MODERATE	Reazioni anafilattoidi SEVERE
Nausea	Prurito	Dispnea	Distress respiratorio grave
Vomito	Eritema	Broncospasmo	Perdita di coscienza
Gusto alterato	Orticaria	Lieve edema laringeo	Convulsioni
Sudorazione	Tosse	Tachicardica sintomatica	Aritmie
Calore	Congestione nasale	Bradicardica sintomatica	Arresto cardiorespiratorio
Vampate	Starnuti	Ipotensione	Angioedema progressivo
Ansia	Lieve gonfiore oculare e facciale	Ipertensione	

Pertanto è necessario che sia sottoscritto, dopo aver letto questo foglio informativo, l'esplicito consenso alla esecuzione di tali esami contrastografici da parte del Paziente o, in sua vece, se impossibilitato ad esprimere coscientemente la propria volontà, di un proprio congiunto, tenendo conto che tali esami sono stati richiesti dal/i Medico/i Responsabile/i in quanto indispensabili per ogni successivo atto terapeutico.